



КАТАЛОГ ЯРІ КУЛЬТУРИ

2020

www.saaten-union.ro



БУДЬ ПРОФЕСІЙНИМ, ВИБЕРИ НАСІННЯ ЗААТЕН УНІОН!

Тільки разом ми
зможемо вийти
на новий рівень
успішності у сільському
господарстві.

Шановні партнери!

Компанія «Заатен Уніон Румунія» розпочала свою діяльність у 1972 році. З того часу швидкими темпами розвивається, поповнюючи своє портфоліо новими сортами та гібридами різних культур. Наше бачення – інвестувати в сучасну генетику та виробляти високоякісне насіння сортів та гібридів, адаптованих до різноманітних умов, здатних генерувати чудові врожаї для всіх наших сільгоспвиробників!

Команда Заатен Уніон працює кожен день із пристрастю та відданістю, щоб перевершити очікування фермерів. Ми вивели на ринок конкурентоспроможні гібриди кукурудзи та соняшнику, які приносять високі і стабільні врожаї і є дуже продуктивними, особливо в складних умовах Румунії та інших країн Південної Європи. Ми пишаємося тим, що можемо запропонувати такий широкий портфель продуктів для партнерів з України.

У цьому каталозі ярових культур 2020 року ви зможете знайти дуже широкий асортимент сортів та гібридів останнього покоління. Цими новими гібридами збагатився насіннєвий портфель компанії, і ми робимо доступною для фермерів генетику, яку вони хочуть. Серед гібридів новинок кукурудзи ми можемо відзначити ЗУР 204 та Зураунд, а також інші уже відомі назви, такі як Зупорто, ЗУМ 305 та ЗУМ 405. Щодо новинок гібридів соняшнику відзначимо Міранду ЗУ – стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (сульфо), який вразив своїм потенціалом продуктивності.

Розширюється традиційно широкий асортимент гібридів Clearfield – Драйвер КЛ, Зурімі КЛ, Зубелла КЛ, Маркеза КЛ. Зараз ми присутні у всіх технологіях вирощування соняшнику: імі, сульфо, класиці стійкої до вовчка та гібридах високоолеїнового типу. Незважаючи на те, що існує чимало зон для вирощування, які відрізняються ґрунтово-кліматичними умовами та агрономічними особливостями, портфель Saaten Union пропонує індивідуальні гібриди, адаптовані до будь-яких умов. Цього року пропонуємо насіння 3-х сортів сої Адсой, Корона та Тена, які відрізняються вегетаційним періодом. Завершується реєстрація сортів гороху, нуту, кормових бобів та люцерни, які невдовзі збагатять наш асортимент культур. Потреби всіх фермерів та партнерів, з якими ми працюємо, є для нас пріоритетними. Щоб зробити правильний вибір, наші представники та торгова команда Saaten Union у вашому розпорядженні.

З професійними фермерами може працювати лише команда професіоналів!

Щороку ми хочемо, щоб продукція Saaten Union була найвищої якості.

Пам'ятайте, ми вдосконалюємося на майбутнє!

З повагою
Генеральний директор «Заатен Уніон Румунія»
МІХАЙ МІРІЦЕСКУ


ЗМІСТ | 2020

ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ

- | | |
|----|---|
| 4 | Загальна характеристика гібридів кукурудзи |
| 5 | <small>НОВИНКА</small> ЗУР 204 <small>ФАО 260</small> |
| 6 | ЗУПОРТО <small>ФАО 280</small> |
| 7 | ІСХ 303 <small>ФАО 300</small> |
| 8 | ЗУРАУНД <small>ФАО 310</small> |
| 9 | ЗУМ 305 <small>ФАО 330</small> |
| 10 | ОС 378 <small>ФАО 350</small> |
| 11 | ОССК 396 <small>ФАО 380</small> |
| 12 | ЗУМ 405 <small>ФАО 400</small> |
| 13 | <small>НОВИНКА</small> ЗУР 307 <small>ФАО 410</small> |

ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ

- | | |
|----|--|
| 14 | Загальна характеристика гібридів соняшнику |
| 15 | СЮРПРИЗ КЛ ПЛЮС |
| 16 | ПАРАІЗО 1000 КЛ ПЛЮС |
| 17 | ЛУЦІЯ КЛ ПЛЮС |
| 18 | <small>НОВИНКА</small> ЗУБЕЛЛА КЛ |
| 19 | ПУНТАСОЛ КЛ |
| 20 | <small>НОВИНКА</small> ДРАЙВЕР КЛ |
| 21 | <small>НОВИНКА</small> МАРКЕЗА КЛ |
| 22 | <small>НОВИНКА</small> ЗУРІМІ КЛ |
| 23 | ПАРАІЗО 102 СЛ |
| 24 | САНТЕК ХО КЛ |
| 25 | ІН 5543 ІМІ + ТАМАРА КЛ |
| 26 | ВЕЛКО |
| 27 | <small>НОВИНКА</small> МІРАНДА ЗУ |
| 29 | СОЯ |



Перелік гібридів кукурудзи для сівби у 2020 році від Заатен Уніон Румунія							
Гібрид	ФАО	Тип зерна	Напря́м використання	Холодо-стійкість	Посухо-стійкість	Віддача вологи	Потенці́ал продуктивності т/га
ЗУР 204	260	зубоподібне	зерно	висока	висока	дуже швидка	14,5
ЗУПОРТО	280	зубоподібне	зерно	середня	середня	швидка	14,0
СПАРТАН*	300	зубоподібне	зерно/крохмаль	середня	дуже висока	швидка	16,5
ІСХ 303	300	зубоподібне	зерно	висока	середня	середня	16,0
ЗУРАУНД	310	зубоподібне	зерно/силос	висока	середня	середня	15,0
ЗУМ 305	330	зубоподібне	зерно/силос	висока	дуже висока	середня	17,0
ОС 378	350	зубоподібне	зерно/крохмаль	висока	дуже висока	дуже швидка	16,5
ОССК 396	380	зубоподібне	зерно/силос	середня	середньовисока	середня	16,0
ЗУМ 405	400	зубоподібне	зерно/крохмаль/силос	середня	висока	швидка	17,0
ЗУР 307	410	зубоподібне	зерно	середня	дуже висока	швидка	16,5

* – державна реєстрація триває.



	18–20 рядів у початку
	36–42 зерна в ряді
	280–300 маса 1000 зерен


ЗУР 204 НОВИНКА
ФАО 260

Широка зональна адаптація

ПЕРЕВАГИ:

- Середньоранній гібрид для всіх зон вирощування
- Має високий потенціал урожайності та швидку вологовіддачу зерна
- Хороша адаптивність до стресів, особливо в період цвітіння та наливу зерна
- Висока стійкість до комплексу хвороб кукурудзи

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип гібрида	простий
Тип зерна	зубоподібний
Адаптація до біокліматичних умов	
Толерантність до низьких температур навесні	висока
Толерантність до спеки та посухи	висока
Технологія вирощування	
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)	75–85 тис. росл./га
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)	60–65 тис. росл./га
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту	середня
Розвиток рослини	
Ріст на початку вегетації	інтенсивний
Висота рослини	205–220 см
Висота кріплення качана	100–110 см
Ефект Stay green	середній
Темпи вологовіддачі зерном	дуже швидкі
Стойкість до вилягання	дуже висока
Продуктивність	
Потенціал продуктивності	>16 т/га
Толерантність до	
Пухирчастої сажки	дуже висока
Фузаріозу стебла	дуже висока
Гельмінтоспоріозу	дуже висока




ЗУПОРТО ФАО 280

Здолає кліматичний стрес

ПЕРЕВАГИ:

- Швидкі темпи росту на початку вегетації
- Висока стійкість до основних хвороб
- Адаптивний до стресових умов вирощування та строків сівби
- Високий потенціал урожайності в своїй групі стиглості

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип гібрида	простий
Тип зерна	зубоподібний
Адаптація до біокліматичних умов	
Толерантність до низьких температур навесні	середня
Толерантність до спеки та посухи	висока
Технологія вирощування	
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)	70–80 тис. росл./га
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)	60–70 тис. росл./га
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту	висока
Розвиток рослини	
Ріст на початку вегетації	інтенсивний
Висота рослини	210–230 см
Висота кріплення качана	90–100 см
Ефект Stay green	середній
Темпи вологовіддачі зерном	швидкі
Стійкість до вилягання	висока
Продуктивність	
Потенціал продуктивності	> 15 т/га
Толерантність до	
Пухирчастої сажки	дуже висока
Фузаріозу стебла	дуже висока
Гельмінтоспоріозу	дуже висока

16–18 рядів у початку

36 зерен у ряді

300–320 маса 1000 зерен




ІСХ 303 ФАО 300

Лідер продуктивності в ФАО 300

ПЕРЕВАГИ:

- Пластичний гібрид, адаптивний до умов вирощування
- Висока стійкість до вилягання
- Придатний для ранньої сівби
- Швидка вологовіддача зерном

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип гібрида	простий
Тип зерна	зубоподібний
Адаптація до біокліматичних умов	
Толерантність до низьких температур навесні	дуже висока
Толерантність до спеки та посухи	середня
Технологія вирощування	
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)	70–85 тис. росл./га
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)	55–70 тис. росл./га
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту	дуже висока
Розвиток рослини	
Ріст на початку вегетації	інтенсивний
Висота рослини	220–260 см
Висота кріплення качана	90–100 см
Ефект Stay green	середній
Темпи вологовіддачі зерном	середні
Стійкість до вилягання	висока
Продуктивність	
Потенціал продуктивності	> 16,5 т/га
Толерантність до	
Пухирчастої сажки	дуже висока
Фузаріозу стебла	дуже висока
Гельмінтоспоріозу	дуже висока

18–20 рядів у початку

40–42 зерна в ряді

300–320 маса 1000 зерен

**SAATEN
UNION**
Züchtung ist Zukunft




ЗУРАУНД ФАО 310

Ефективність та технологічність

ПЕРЕВАГИ:

- Відзначається інтенсивним ростом у початковий період, холодостійкий
- Високий потенціал продуктивності, витримує деяке загущення
- Середньорослий з добре розвинутою листовою поверхнею, ефект Stay green
- Хороша стійкість до ґрунтової і повітряної засухи

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип гібрида	простий
Тип зерна	зубоподібний
Адаптація до біокліматичних умов	
Толерантність до низьких температур навесні	висока
Толерантність до спеки та посухи	висока
Технологія вирощування	
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)	60–75 тис. росл./га
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)	55–65 тис. росл./га
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту	висока
Розвиток рослини	
Ріст на початку вегетації	дуже інтенсивний
Висота рослини	230–280 см
Висота кріплення качана	100–110 см
Ефект Stay green	дуже виражений
Темпи вологовіддачі зерном	середні
Стійкість до вилягання	висока
Продуктивність	
Потенціал продуктивності	>15,0 т/га
Толерантність до	
Пухирчастої сажки	дуже висока
Фузаріозу стебла	висока
Гельмінтоспоріозу	дуже висока

16–18 рядів у початку

42–45 зерен у ряді

310–330 маса 1000 зерен




ЗУМ 305 ФАО 330

Необмежені переваги

ПЕРЕВАГИ:

- Універсальний гібрид на зерно та силос
- Дуже висока продуктивність при вирощуванні за інтенсивною технологією
- Потужна рослина з добре розвинутою листовою поверхнею, ефект Stay green
- Формує видовжені качани з відмінним рівнем запиленості

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип гібрида	простий
Тип зерна	зубоподібний
Адаптація до біокліматичних умов	
Толерантність до низьких температур навесні	висока
Толерантність до спеки та посухи	висока
Технологія вирощування	
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)	60–75 тис. росл./га
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)	55–65 тис. росл./га
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту	висока
Розвиток рослини	
Ріст на початку вегетації	інтенсивний
Висота рослини	240–280 см
Висота кріплення качана	100–110 см
Ефект Stay green	дуже виражений
Темпи вологовіддачі зерном	середні
Стійкість до вилягання	дуже висока
Продуктивність	
Потенціал продуктивності	>17,0 т/га
Толерантність до	
Пухирчастої сажки	дуже висока
Фузаріозу стебла	висока
Гельмінтоспоріозу	дуже висока

16–18 рядів у початку

32–36 зерен у ряді

335–340 маса 1000 зерен

**SAATEN
UNION**
Züchtung ist Zukunft

ІНТЕНСИВНИЙ
ПОЧАТКОВИЙ
РІСТ

ПОСУХОСТІЙКИЙ


**ОС 378**

ФАО 350

Стабільність та вологовіддача

ПЕРЕВАГИ:

- Гібрид для інтенсивних технологій
- Дуже висока продуктивність та високі темпи вологовіддачі
- Гарна холодостійкість за ранньої сівби
- Толерантний до посушливих умов

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

Тип гібрида	простий
Тип зерна	зубоподібний
Адаптація до біокліматичних умов	
Толерантність до низьких температур навесні	дуже висока
Толерантність до спеки та посухи	дуже висока
Технологія вирощування	
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)	60–75 тис. росл./га
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)	55–65 тис. росл./га
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту	висока
Розвиток рослини	
Ріст на початку вегетації	помірний
Висота рослини	240–280 см
Висота кріплення качана	105–120 см
Ефект Stay green	середній
Темпи вологовіддачі зерном	дуже швидкі
Стійкість до вилягання	висока
Продуктивність	
Потенціал продуктивності	>16,5 т/га
Толерантність до	
Пухирчастої сажки	висока
Фузаріозу стебла	дуже висока
Гельмінтоспоріозу	висока

ІНТЕНСИВНИЙ
ПОЧАТКОВИЙ
РІСТ

ПОСУХОСТІЙКИЙ


**ОССК 396**

ФАО 380

Потужний та універсальний

ПЕРЕВАГИ:

- Високоякісне зерно та добрі поживні якості силосу
- Краще реалізовує потенціал у незагущених посівах
- Добре розвинена коренева система
- Адаптивний до стресових умов

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

Тип гібрида	простий
Тип зерна	зубоподібний
Адаптація до біокліматичних умов	
Толерантність до низьких температур навесні	середня
Толерантність до спеки та посухи	середньовисока
Технологія вирощування	
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)	60–70 тис. росл./га
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)	50–55 тис. росл./га
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту	висока
Розвиток рослини	
Ріст на початку вегетації	помірний
Висота рослини	240–280 см
Висота кріплення качана	110–120 см
Ефект Stay green	слабо виражений
Темпи вологовіддачі зерном	середні
Стійкість до вилягання	дуже висока
Продуктивність	
Потенціал продуктивності	>16,0 т/га
Толерантність до	
Пухирчастої сажки	висока
Фузаріозу стебла	середня
Гельмінтоспоріозу	середня

ІНТЕНСИВНИЙ
ПОЧАТКОВИЙ
РІСТ

ПОСУХОСТІЙКИЙ


ЕФЕКТ
STAY GREEN**ЗУМ 405** ФАО 400

Захмарна продуктивність

ПЕРЕВАГИ:

- Лідер по продуктивності, універсальний за використанням
- Толерантний до основних хвороб
- Дуже стійкий до ґрунтової та повітряної засухи
- Компактний, стійкий до вилягання, не переростає в умовах зрошення

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип гібрида	простий
Тип зерна	зубоподібний
Адаптація до біокліматичних умов	
Толерантність до низьких температур навесні	середня
Толерантність до спеки та посухи	дуже висока
Технологія вирощування	
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)	55–65 тис. росл./га
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)	45–55 тис. росл./га
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту	середньовисока
Розвиток рослини	
Ріст на початку вегетації	повільний
Висота рослини	230–260 см
Висота кріплення качана	100–110 см
Ефект Stay green	виражений
Темпи вологовіддачі зерном	швидкі
Стійкість до вилягання	дуже висока
Продуктивність	
Потенціал продуктивності	>17,0 т/га
Толерантність до	
Пухирчастої сажки	висока
Фузаріозу стебла	дуже висока
Гельмінтоспоріозу	дуже висока

16–18 рядів у початку

36 зерен у ряді

320–335 маса 1000 зерен

ІНТЕНСИВНИЙ
ПОЧАТКОВИЙ
РІСТ


ПОСУХОСТІЙКИЙ

ЕФЕКТ
STAY GREEN**ЗУР 307** НОВИНКА
ФАО 410Пластичність – Стійкість –
Продуктивність

ПЕРЕВАГИ:

- Дуже високий виробничий потенціал продуктивності в своїй групі стиглості
- Швидкі темпи вологовіддачі
- Дуже стійкий до ґрунтової та повітряної засухи
- Сприятливо реагує на інтенсивні технології та придатний до вирощування у різних ґрунтово-кліматичних умовах

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип гібрида	простий
Тип зерна	зубоподібний
Адаптація до біокліматичних умов	
Толерантність до низьких температур навесні	середня
Толерантність до спеки та посухи	дуже висока
Технологія вирощування	
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)	65–70 тис. росл./га
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)	50–55 тис. росл./га
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту	висока
Розвиток рослини	
Ріст на початку вегетації	помірний
Висота рослини	240–260 см
Висота кріплення качана	100–110 см
Ефект Stay green	виражений
Темпи вологовіддачі зерном	швидкі
Стійкість до вилягання	дуже висока
Продуктивність	
Потенціал продуктивності	>17,5 т/га
Толерантність до	
Пухирчастої сажки	висока
Фузаріозу стебла	дуже висока
Гельмінтоспоріозу	дуже висока

18–20 рядів у початку

38–42 зерна в ряді

310–330 маса 1000 зерен

Гібрид	Рік реєстрації	Група стиглості	Потенціал урожайності, бали	Висота рослин, см	Початковий розвиток, бали	Розташування кошика	Олійність, %	Вміст олеїнової к-ти, %	Густота перед збиранням, тис./га
Гібриди для вирощування по системі Clearfield									
Сантек ХО КЛ	2018	ранньостигла	8	155-165	7	донизу	48-51	до 92	50-60
Драйвер КЛ new	2019	ранньостигла	8	150-160	8	напівпоникле	48-51	65-68	55-60
ІН 5543 ІМІ	2015	середньорання	8	165-175	7	напівпоникле	48-50	64-68	50-60
Зубелла КЛ new	2019	середньорання	8,5	150-160	8	донизу	49-51	65-69	55-60
Пунтасол КЛ	2017	середньорання	9	165-175	7	напівпоникле	48-50	64-67	50-55
Тамара КЛ	2013	середньорання	8	155-165	7	донизу	48-50	66-69	45-55
Зурфер КЛ new	2020	середньорання	9	160-170	7	напівпоникле	49-50	65-68	50-55
Санфлора КЛ	2011	середньостигла	9	170-185	7	напівпоникле	49-50	70-72	50-60
Зурімі КЛ new	2018	середньостигла	8,5	160-170	6	донизу	48-49	64-68	45-55
Маркеза КЛ new	2019	середньостигла	9	165-175	8	напівпоникле	49-51	66-69	45-55
Параізо 102 СЛ	2010	середньостигла	8,5	150-165	6	донизу	49-50	65-67	45-55
Гібриди для вирощування по системі Clearfield Plus									
Сюрприз КЛ Плюс	2018	ранньостигла	7,5	165-175	8	напівпоникле	46-49	66-69	55-65
Параізо 1000КЛ Плюс	2015	середньостигла	8,5	160-170	7	напівпоникле	50-51	65-68	45-55
Луція КЛ Плюс	2015	середньопізня	9	165-175	7	донизу	49-50	66-68	45-55
Класичні гібриди									
Велко (oro A-F)	2017	середньорання	9	155-165	8	напівпоникле	50-52	63-66	55-60
Трибенурон-метил стійкі гібриди (СУЛЬФО)									
Міранда ЗУ (oro A-F) new	2020	середньорання	8	170-180	7	напівпоникле	48-50	65-67	50-55




СЮРПРИЗ КЛ ПЛЮС

Скоростиглість розширює
можливості

ПЕРЕВАГИ:

- Ранньостиглий гібрид, адаптований до технології Clearfield Plus
- Компактні рослини з гарною стійкістю до вилягання
- Універсальний за строками посіву та для використання у різних кліматичних зонах
- Швидке дозрівання та інтенсивна вологовіддача

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвітіння	раннє
Достигання	раннє
Період вегетації	100–106 днів
Адаптація до біокліматичних умов	
Стійкість до спеки та посухи	висока
Стійкість до вилягання/ламкість стебла	дуже висока
Технологія вирощування	
Густота перед збиранням	55–65 тис. росл./га
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу	стійкий
Морфологія рослини	
Розмір листка	середній
Висота рослини	165–175 см
Розташування кошика	напівпоникле
Продуктивність	
Потенціал продуктивності	3,7–3,9 т/га
Вміст олії	46–49 %
Маса 1000 насінин, г	60–62
Толерантність до	
Склеротинії	дуже висока
Фомопсису	середня
Борошнистої роси	дуже висока
Сірої гнилі	середня
Стійкість до вовчка	нестійкий




ПАРАІЗО 1000 КЛ ПЛЮС

1000 причин придбати

ПЕРЕВАГИ:

- Перший зареєстрований в Європі гібрид до технології Clearfield Plus
- Середньостиглий гібрид зі стабільно високою урожайністю та олійністю насіння
- Невибгливий до умов вирощування
- Дуже вирівняний на всіх етапах розвитку

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвітіння	пізніє
Достигання	середнє
Період вегетації	116–120 днів
Адаптація до біокліматичних умов	
Стійкість до спеки та посухи	дуже висока
Стійкість до вилягання/ламкість стебла	дуже висока
Технологія вирощування	
Густота перед збиранням	45–55 тис. росл./га
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу	стійкий
Морфологія рослини	
Розмір листка	середній
Висота рослини	160–170 см
Розташування кошика	напівпоникле
Продуктивність	
Потенціал продуктивності	4,9 т/га
Вміст олії	50–51 %
Маса 1000 насінин, г	56–58
Толерантність до	
Склеротинії	дуже висока
Фомопсису	висока
Борошнистої роси	висока
Сірої гнилі	середня
Стійкість до вовчка	нестійкий




ЛУЦІЯ КЛ ПЛЮС

Краща страховка для фермера

ПЕРЕВАГИ:

- Середньопізній гібрид з надзвичайно високим потенціалом продуктивності
- Має високу генетичну стійкість до комплексу хвороб
- Дуже хороша стійкість до вилягання
- Швидкий стартовий ріст

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.




ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвітіння	пізніє
Достигання	пізніє
Період вегетації	118–122 дні
Адаптація до біокліматичних умов	
Стійкість до спеки та посухи	висока
Стійкість до вилягання/ламкість стебла	дуже висока
Технологія вирощування	
Густота перед збиранням	45–55 тис. росл./га
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу	стійкий
Морфологія рослини	
Розмір листка	середній
Висота рослини	165–175 см
Розташування кошика	нахил донизу
Продуктивність	
Потенціал продуктивності	4,4–4,7 т/га
Вміст олії	49–50 %
Маса 1000 насінин, г	55–60
Толерантність до	
Склеротинії	дуже висока
Фомопсису	висока
Борошнистої роси	висока
Сірої гнилі	середня
Стійкість до вовчка	нестійкий



СТІЙКИЙ
ДО ХВОРОБ

ПОСУХОСТІЙКИЙ

ВИСОКО-
ПРОДУКТИВНИЙ


ЗУБЕЛЛА КЛ НОВИНКА

Віддаєте перевагу ранньому врожаю?

ПЕРЕВАГИ:

- Середньоранній адаптивний гібрид до різних ґрунтово-кліматичних умов вирощування та рівня технологій
- Висока продуктивність для своєї групи стиглості
- Відзначається посухо- та жаростійкістю, інтенсивним сторовим розвитком
- Має високий вміст олії

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвітіння	середнє
Достигання	середньораннє
Період вегетації	110–115 днів

Адаптація до біокліматичних умов

Стійкість до спеки та посухи	дуже висока
Стійкість до вилягання/ламкості стебла	дуже висока

Технологія вирощування

Густота перед збиранням	55–60 тис. росл./га
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу	стійкий

Морфологія рослини

Розмір листка	великий
Висота рослини	150–160 см
Розташування кошика	нахил донизу

Продуктивність

Потенціал продуктивності	4,2–4,3 т/га
Вміст олії	49–51 %
Маса 1000 насінин, г	58–61

Толерантність до

Склеротинії	дуже висока
Фомопсису	дуже висока
Борошнистої роси	дуже висока
Сірої гнилі	висока
Стійкість до вовчка	нестійкий

СТІЙКИЙ
ДО ХВОРОБ

ПОСУХОСТІЙКИЙ

ВИСОКО-
ПРОДУКТИВНИЙ


ПУНТАСОЛ КЛ

Завантаж автомобіль на повну

ПЕРЕВАГИ:

- Надзвичайно високопродуктивний з високою олійністю
- Гібрид із швидким початковим ростом, однорідний
- Відмінна стійкість до вилягання
- Рекомендовано для інтенсивних технологій

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвітіння	середньораннє
Достигання	середньораннє
Період вегетації	112–116 днів

Адаптація до біокліматичних умов

Стійкість до спеки та посухи	висока
Стійкість до вилягання/ламкості стебла	дуже висока

Технологія вирощування

Густота перед збиранням	50–55 тис. росл./га
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу	стійкий

Морфологія рослини

Розмір листка	середній
Висота рослини	165–175 см
Розташування кошика	напівпоникле


Продуктивність

Потенціал продуктивності	5,5 т/га
Вміст олії	44–48 %
Маса 1000 насінин, г	49–52

Толерантність до

Склеротинії	середня
Фомопсису	середня
Борошнистої роси	дуже висока
Сірої гнилі	середня
Стійкість до вовчка	нестійкий





ДРАЙВЕР КЛ


НОВИНКА

Відчуй переваги в екстенсивних умовах

ПЕРЕВАГИ:


- Ранньостиглий, компактний та вирівняний на всіх етапах розвитку гібрид
- Високопродуктивний, особливо в стресових умовах
- Рекомендуємо для екстенсивних технологій
- Має високий рівень самозапилення та гарно виповнений кошик

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвітіння	середньораннє
Достигання	раннє
Період вегетації	105–110 днів
Адаптація до біокліматичних умов	
Стійкість до спеки та посухи	висока
Стійкість до вилягання/ламкості стебла	висока
Технологія вирощування	
Густота перед збиранням	55–60 тис. росл./га
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу	стійкий
Морфологія рослини	
Розмір листка	середній
Висота рослини	150–160 см
Розташування кошика	напівпоникле
Продуктивність	
Потенціал продуктивності	4,5 т/га
Вміст олії	48–51 %
Маса 1000 насінин, г	57–59
Толерантність до	
Склеротинії	середня
Фомопсису	середня
Борошнистої роси	дуже висока
Сірої гнилі	висока
Стійкість до вовчка	нестійкий



МАРКЕЗА КЛ


НОВИНКА

Все краще та краще

ПЕРЕВАГИ:

- Середньостиглий гібрид для інтенсивних високопродуктивних технологій
- Хороша посухо- та жаростійкість
- Вирівняний, середньорослий з високою стійкістю до вилягання
- Гарний пакет комплексної стійкості до склеротинії, пероноспорозу, вертицильозу та фомопсису


Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвітіння	середнє
Достигання	середнє
Період вегетації	115–120 днів
Адаптація до біокліматичних умов	
Стійкість до спеки та посухи	висока
Стійкість до вилягання/ламкості стебла	висока
Технологія вирощування	
Густота перед збиранням	45–55 тис. росл./га
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу	стійкий
Морфологія рослини	
Розмір листка	середній
Висота рослини	165–175 см
Розташування кошика	напівпоникле
Продуктивність	
Потенціал продуктивності	4,8–5,2 т/га
Вміст олії	49–51 %
Маса 1000 насінин, г	57–59
Толерантність до	
Склеротинії	середня
Фомопсису	середня
Борошнистої роси	дуже висока
Сірої гнилі	висока
Стійкість до вовчка	нестійкий






ЗУРІМІ КЛ НОВИНКА

Надзвичайний потенціал

ПЕРЕВАГИ:

- Гібрид нового покоління з високою потенціальною продуктивністю
- Хороша адаптивність до ґрунтово-кліматичних умов
- Має високий рівень запиленості та виповнений кошик
- Дуже вирівняний гібрид

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвітіння	середнє
Достигання	середнє
Період вегетації	114–118 днів

Адаптація до біокліматичних умов

Стійкість до спеки та посухи	висока
Стійкість до вилягання/ламкості стебла	висока

Технологія вирощування

Густота перед збиранням	45–55 тис. росл./га
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу	стійкий

Морфологія рослини


Розмір листка	великий
Висота рослини	160–170 см
Розташування кошика	нахил донизу

Продуктивність

Потенціал продуктивності	4,5–4,8 т/га
Вміст олії	48–49 %
Маса 1000 насінин, г	57–59

Толерантність до

Склеротинії	дуже висока
Фомопсису	висока
Борошнистої роси	дуже висока
Сірої гнилі	дуже висока
Стійкість до вовчка	нестійкий




ПАРАІЗО 102 CL

Лідер продаж

ПЕРЕВАГИ:

- Середньостиглий гібрид з високим потенціалом продуктивності за різних технологій
- Надзвичайно посухостійкий
- Має високий рівень запиленості та виповнений кошик
- Висока стійкість до основних хвороб соняшнику

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвітіння	середнє
Достигання	середнє
Період вегетації	116–120 днів

Адаптація до біокліматичних умов

Стійкість до спеки та посухи	висока
Стійкість до вилягання/ламкості стебла	висока

Технологія вирощування

Густота перед збиранням	45–55 тис. росл./га
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу	стійкий

Морфологія рослини

Розмір листка	середній
Висота рослини	150–165 см
Розташування кошика	нахил донизу

Продуктивність

Потенціал продуктивності	4,4–4,7 т/га
Вміст олії	49–50 %
Маса 1000 насінин, г	50–55

Толерантність до

Склеротинії	середня
Фомопсису	висока
Борошнистої роси	дуже висока
Сірої гнилі	середня
Стійкість до вовчка	нестійкий






САНТЕК ХО КЛ

Високотехнологічна квітка

ПЕРЕВАГИ:

- Гібрид з вмістом олеїнової кислоти до 90 %
- Відмінна стійкість до посухи та спеки
- Середньорослий з високою стійкістю до склеротинії та фомопсису
- Стійкий до вилягання та осипання насіння при дозріванні

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвітіння	середньораннє
Достигання	раннє
Період вегетації	105–108 днів

Адаптація до біокліматичних умов

Стійкість до спеки та посухи	дуже висока
Стійкість до вилягання/ламкість стебла	дуже висока

Технологія вирощування

Густота перед збиранням	50–60 тис. росл./га
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу	стійкий

Морфологія рослини

Розмір листка	середній
Висота рослини	155–165 см
Розташування кошика	напівпоникле

Продуктивність

Потенціал продуктивності	3,8–4,1 т/га
Вміст олії	46–48 %
Маса 1000 насінин, г	65–70

Толерантність до

Склеротинії	дуже висока
Фомопсису	висока
Борошнистої роси	середня
Сірої гнилі	висока
Стійкість до вовчка	нестійкий



ІН 5543 ІМІ

Маєш достатньо вологи – спробуй

ПЕРЕВАГИ:

- Стабільний при вирощуванні в різних ґрунтово-кліматичних умовах
- Пластичний до густоти стояння
- Висока стійкість до вилягання
- Відмінна стійкість до склеротиніозу, фомопсису та всіх рас пероноспорозу

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвітіння	середньораннє
Достигання	середньораннє
Період вегетації	108–110 днів

Адаптація до біокліматичних умов

Стійкість до спеки та посухи	висока
Стійкість до вилягання/ламкість стебла	висока

Технологія вирощування

Густота перед збиранням	50–60 тис. росл./га
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу	стійкий

Морфологія рослини

Розмір листка	середній
Висота рослини	165–175 см
Розташування кошика	напівпоникле

Продуктивність

Потенціал продуктивності	4,3–4,6 т/га
Вміст олії	46–50 %
Маса 1000 насінин, г	52–56

Толерантність до

Склеротинії	висока
Фомопсису	висока
Борошнистої роси	дуже висока
Сірої гнилі	середня
Стійкість до вовчка	нестійкий



ТАМАРА КЛ

Має сенс в поганих умовах

ПЕРЕВАГИ:

- Високопродуктивний з інтенсивним ростом
- Рекомендовано для посушливих регіонів
- Відмінна стійкість до вилягання
- Добра стійкість до комплексу хвороб

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвітіння	середнє
Достигання	середньораннє
Період вегетації	114–116 днів

Адаптація до біокліматичних умов

Стійкість до спеки та посухи	дуже висока
Стійкість до вилягання/ламкість стебла	висока

Технологія вирощування

Густота перед збиранням	45–55 тис. росл./га
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу	стійкий

Морфологія рослини

Розмір листка	середній
Висота рослини	155–165 см
Розташування кошика	донизу

Продуктивність

Потенціал продуктивності	4,4–4,6 т/га
Вміст олії	48–50 %
Маса 1000 насінин, г	53–57

Толерантність до

Склеротинії	середня
Фомопсису	середня
Борошнистої роси	дуже висока
Сірої гнилі	висока
Стійкість до вовчка	нестійкий




ВЕЛКО
(ORO A-F)
Класика вражає

ПЕРЕВАГИ:

- Відзначається швидким початковим розвитком та адаптивністю до умов вирощування
- Стійкий до вилягання
- Стійкий до вовчка рас А-F
- Високопродуктивний з високим вмістом олії

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвітіння	середньораннє
Достигання	середньораннє
Період вегетації	108–112 днів

Адаптація до біокліматичних умов

Стійкість до спеки та посухи	дуже висока
Стійкість до вилягання/ламкість стебла	дуже висока

Технологія вирощування

Густота перед збиранням	55–60 тис. росл./га
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу	нестійкий

Морфологія рослини

Розмір листка	великий
Висота рослини	155–165 см
Розташування кошика	напівпоникле

Продуктивність

Потенціал продуктивності	4,8–5,2 т/га
Вміст олії	50–52 %
Маса 1000 насінин, г	60–68

Толерантність до

Склеротинії	висока
Фомопсису	висока
Борошнистої роси	дуже висока
Сірої гнилі	середня
Стійкість до вовчка	A-F раси




МІРАНДА 3У НОВИНКА
(ORO A-E)
На піку прибутковості

ПЕРЕВАГИ:

- Стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU)
- Толерантний до комплексу основних хвороб соняшнику
- Стійкий до вовчка рас А-E
- Пластичний, гарний рівень запиленості, стабільно продуктивний гібрид

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвітіння	середнє
Достигання	середнє
Період вегетації	112–116 днів

Адаптація до біокліматичних умов

Стійкість до спеки та посухи	дуже висока
Стійкість до вилягання/ламкість стебла	дуже висока

Технологія вирощування

Густота перед збиранням	55–60 тис. росл./га
Стійкість до гербіцидів на основі трибенурон-метил (СУЛЬФО)	стійкий

Морфологія рослини

Розмір листка	середній
Висота рослини	170–180 см
Розташування кошика	напівпоникле

Продуктивність

Потенціал продуктивності	4,2–4,3 т/га
Вміст олії	43–47 %
Маса 1000 насінин, г	58–64

Толерантність до

Склеротинії	висока
Фомопсису	висока
Борошнистої роси	висока
Сірої гнилі	висока
Стійкість до вовчка	A-E раси





ОЧІКУЙТЕ
ГІБРИДИ
СОНЯШНИКУ

Алекса СУ
Даверо СУ
ЗУРО 162

WWW.SAATEN-UNION.RO

АДСОЙ

- Ранньостиглий сорт з надзвичайно інтенсивним початковим розвитком
- Середньорослий сорт з високою стійкістю до полягання та осипання
- Раннє й однорідне дозрівання забезпечує стабільну продуктивність в північних та західних регіонах України
- Сорт зручний до збирання завдяки високим кріпленням бобів

Опис сорту		Стресові фактори та толерантність до хвороб	
Стиглість	000 – рання (98–102 дні)	Стійкість до вилягання	висока
Ранній розвиток	інтенсивний	Стійкість до посухи	дуже висока
Тип рослини	indeterminante	Стійкість до осипання	дуже висока
Висота рослин	80–92 см	Толерантність до комплексу хвороб	висока
Висота прикріплення нижнього боба	14–16 см	Урожайність та якість	
Колір квіток	фіолетовий	Потенціальна урожайність, т/га	4,0–4,5
Колір опушення	коричневий	Маса 1000 насінин	170–180 г
Колір насінини	жовтий	Вміст протеїну, %	≥ 47
Колір рубчика	темний	Вміст олії, %	22–23
Агрономічні рекомендації			
Густота до збирання, тис. росл./га		700–750	
Міжряддя, см		12,5–25	

КОРОНА

- Високий та стабільний урожай у різних зонах вирощування
- Висока стійкість до вилягання з гарною стійкістю до основних хвороб сої, особливо до кореневих гнилей та склеротинії
- Корона має дуже швидкий ранній розвиток, що зменшує тиск бур'янів, закриваючи рядки
- Великі зерна з хорошим вмістом протеїну та олії

Опис сорту		Стресові фактори та толерантність до хвороб	
Стиглість	00 – середньорання (110–118 днів)	Стійкість до вилягання	висока
Ранній розвиток	інтенсивний	Стійкість до посухи	дуже висока
Тип рослини	indeterminante	Стійкість до осипання	висока
Висота рослин	90–102 см	Толерантність до комплексу хвороб	висока
Висота прикріплення нижнього боба	14–16 см	Урожайність та якість	
Колір квіток	фіолетовий	Потенціальна урожайність, т/га	4,2–5,0
Колір опушення	коричневий	Маса 1000 насінин	170–180 г
Колір насінини	жовтий	Вміст протеїну, %	≥ 43
Колір рубчика	коричневий	Вміст олії, %	22–23
Агрономічні рекомендації			
Густота до збирання, тис. росл./га		500–550	
Міжряддя, см		12,5–45	

ТЕНА

- Середньостиглий сорт високим потенціалом урожаю
- ТЕНА виділяється своїм міцним стеблом, широким листом, а також великими і твердими стручками з рівномірним дозріванням бобів
- Тена має відмінну адаптивність для всіх типів ґрунтів та забезпечує високу врожайність у стресових ситуаціях
- Висока стійкість до вилягання з гарною стійкістю до основних хвороб сої

Опис сорту		Стресові фактори та толерантність до хвороб	
Стиглість	0 – середньостигла (124–130 днів)	Стійкість до вилягання	дуже висока
Ранній розвиток	інтенсивний	Стійкість до посухи	середня – до високої
Тип рослини	indeterminante	Стійкість до осипання	висока
Висота рослин	90–110 см	Толерантність до комплексу хвороб	висока
Висота прикріплення нижнього боба	16–19 см	Урожайність та якість	
Колір квіток	фіолетовий	Потенціальна урожайність, т/га	4,5–5,2
Колір опушення	коричневий	Маса 1000 насінин	160–170 г
Колір насінини	жовтий	Вміст протеїну, %	≥ 42
Колір рубчика	світлий	Вміст олії, %	≥ 22
Агрономічні рекомендації			
Густота до збирання, тис. росл./га		450–550	
Міжряддя, см		12,5–45	

МИ ВДОСКОНАЛЮЄМО МАЙБУТНЄ



КОРДІН

Олександр Іванович

Менеджер з розвитку продуктів
та бізнесу в країнах СНД

E-mail: alexander.kordin@saaten-union.com

Моб. тел. +38 067 633 08 19



ТАРАСЕВКО

Олександр Анатолійович

Менеджер з розвитку продуктів
та бізнесу в Україні

E-mail: alexander.tarasenko@saaten-union.ro

Моб. тел. +38 050 321 66 22

НОВИНКИ

**ВИСОКОПРОДУКТИВНІ
СОРТИ ДЛЯ РЕГІОНІВ З НЕСТАБІЛЬНИМ
ЗВОЛОЖЕННЯМ ТА ПОСУШЛИВИМИ
ЯВИЩАМИ.**

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ

ФЕЛІКС

Ультраранньостиглий
сорт з високою
якістю зерна

АТЛОН

Стабільно
високий врожай,
якість

KATAPIHA

Відмінна
посухостійкість

ЦЕНТУРІОН

Перевершує очікування

ТРУБЛІОН

Максимальні можливості

www.saaten-union.ro



SAATEN-UNION ROMÂNIA

E-mail: saaten@saaten-union.ro