

FANDAGA



Avantaje:

- Soi de orzoaică de primăvară pentru bere, care prezintă o combinație perfectă între timpurietate și producții ridicate;
- Toleranță ridicată la stresul termic și hidric;
- Talia plantelor este mică spre medie, ceea ce ii conferă o rezistență foarte bună la cădere;
- Soi de orzoaică ce este inclus pe lista verde pentru malț;
- Este recomandat să se aplice o fertilizare echilibrată în funcție de fertilitatea solului, pentru a nu se depăși conținutul de proteină.

Kurzprofil:

---- = foarte slab / timpuriu / mic,

+++ = foarte bun / tardiv / mare

| | |
|------------------------|--------------|
| precocitatea | |
| Ëxtract de malț | foarte mare |
| Masa hectolitrică (MH) | |
| Talia plantelor | mică - medie |
| Rezistență la cădere | |
| Sfasierea frunzelor | |
| Arsura frunzelor | |
| Patatea frunzelor | bună |

FANDAGA

| | |
|-------------------|--|
| aparitia spicului | |
| precocitatea | |

Structura randamentului:

| | |
|---|-------------|
| densitatea de plante (spice/ m ²) | |
| MMB | |
| Boabe pe spic | |
| Ëxtract de malț | foarte mare |

| | |
|------------------------|--|
| calibraj (boabe mari) | |
| Masa hectolitrică (MH) | |
| Perioada de semănat | de la începutul lunii martie până la jumătatea lunii aprilie |
| Cantitatea de sămânță | 350 - 380 bg/m ² |
| Talia plantelor | mică - medie |
| Rezistență la cădere | |
| regulatori de creștere | la avertizare |

Rezistența la boli:

| | |
|---------------------|---|
| Făinare | |
| Rugina brună | |
| Sfasierea frunzelor | |
| Arsura frunzelor | |
| Patarea frunzelor | bună |
| Protecția plantelor | Se recomandă tratamente multiple în cazul unei presiuni ridicate a bolilor. |